

La chevêche d'Athéna (ou chouette chevêche)




figure sur la liste des oiseaux en régression forte et continue, elle a déjà disparu de certaines régions. Sur les 9 espèces de rapaces nocturnes présentes en France, la chevêche est celle dont le déclin est le plus spectaculaire et qui, à moyen terme, est la plus menacée.

Sur les causses, la population de chouette chevêche est suivie depuis 1971 pour le Méjean et 2001 pour le Sauveterre. Les effectifs suivent malheureusement la tendance nationale et ont donc dangereusement régressé. En 2006, sur 45 sites connus sur le causse Méjean, seuls 11 étaient occupés, 6 couples seulement se sont reproduits donnant 8 jeunes à l'envol !

Si toutes les causes de cette régression ne sont pas connues, on peut tout de même avancer un certain nombre d'hypothèses :

- destruction des habitats (fermeture rapide des milieux par les pins),



- dégradation ou disparition des sites de nidification (utilisation des pierres des clapas pour la réfection des pistes, coupes des vieilles haies,...),
- manque de ressources alimentaires (essentiellement l'hiver : baisse des populations de micromammifères),
- augmentation de la prédation,
- utilisation de produits phytosanitaires contaminant la chaîne alimentaire,
- trafic routier grandissant,
- Dérangements (photographes, curieux,...). ●

Des solutions pour les aider

En association avec 9 Parcs naturels Régionaux, le Parc national des Cévennes agit dans le cadre d'un plan national de restauration de l'espèce pour comprendre et tenté enrayer cette forte régression. Cela se traduit concrètement par un suivi annuel de la population (reproduction et recherche de nouveaux sites), par le maintien des clapas (entretien, création) et la pose de nichoirs. Ce plan est complété par l'information et la sensibilisation des scolaires et des habitants. Le Parc souhaite associer les exploitants agricoles à ce programme de conservation.

Quelques mesures favorables à l'espèce :

- Maintien des milieux ouverts (privilégier le pâturage extensif),
- Conservation des clapas, des murets, chazelles et ruines,
- Conservation des haies, des vieux arbres, plantation de nouvelles haies avec des essences locales (frênes, ormes...),
- Limitation des dérangements autour des sites de reproduction,
- Maintien de la rotation des cultures,


- Limitation des pesticides et des traitements phytosanitaires sur les zones concernées,
- Respect de la tranquillité des sites par les randonneurs, photographes animaliers... ●

Appel a témoins

Pour nous faire part de vos observations de la Chevêche d'Athéna, ou si vous en trouvez une, blessée ou morte, contactez le Parc national des Cévennes au 04 66 45 62 81. ●

Pour en savoir plus

- Michel JUILLARD, 1984, La Chouette chevêche, Coll. « Nos oiseaux », Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux, Prangins, 243p.
- GENOT J.C. & LECOMTE P., 2002, La Chevêche d'Athéna, Delachaux et Niestlé, Les sentiers naturalistes, 144p.
- GENOT J.-C., 2005.- La Chevêche d'Athéna, Athene noctua, dans la réserve de la biosphère des Vosges du Nord de 1984 à 2004. Ciconia, 29 : 1-272.
- Christian FOSSERAT & Bernard BERTRAND, Les quatre saisons de la Chevêche, 2005, Editions de Terran, Aspet, 132p.
- Bernard BERTRAND et Eliane HAROUX-METAYER, 2001, Les Chevêches aux yeux d'or, Editions de Terran, Aspet
- <http://cheveche.lpo.fr/>
- <http://www.noctua.org/>
- Parc national des Cévennes
6 bis, place du Palais 48400 Florac
Tél : 04 66 49 53 01
site internet : www.cevennes-parcnational.fr ●



Habitats

Présente dans de nombreuses régions de France, la Chevêche se rencontre dans des habitats très variés (prairies avec des saules têtards, vergers, périphérie des villages...).

Dans le Parc national des Cévennes, elle est présente essentiellement sur le causse Méjean et le causse de Sauveterre. Mais on la trouve également ponctuellement sur le causse noir, dans les bocages du Valdonnez ou encore sur les contreforts des cans. Inféodée aux milieux ouverts, la chouette chevêche trouve sur les causses de bonnes conditions de nidification. Elle niche principalement dans les clapas (tas de cailloux), mais peut aussi choisir les ruines, granges ou les arbres creux. Elle vit sur de vastes zones ouvertes (les pelouses calcaires) généralement à proximité de petites surfaces cultivées qui lui offrent un terrain de chasse privilégié. Elle est très sensible à la progression des forêts et donc à la fermeture des milieux. ●

Description

La Chevêche d'Athéna *Athene noctua* est une toute petite chouette aux yeux jaunes. La femelle, plus imposante que le mâle, possède le même plumage et il est bien difficile de les différencier. Sa tête est ronde et large, ses yeux dorés sont marqués d'un sourcil blanc oblique qui lui donne un petit air sévère. Son dos est brun tacheté de blanc. Sa silhouette est facilement reconnaissable tout comme son vol onduleux à la manière d'un pic. Posée sur un clapas, elle est parfois difficile à distinguer tant ses couleurs sont semblables à la pierre. Si son activité est plus intense à l'aube et au crépuscule, on peut aussi aisément la rencontrer en plein jour.

Nom : Chevêche d'Athéna, Chouette Chevêche, « la t'chot »

Nom scientifique : *Athene noctua*

Taille : 20 – 22 cm (la femelle est plus grande que le mâle)

Envergure : 55 – 61 cm

Poids : ♀ : 170 – 250 g ♂ : 150 – 200 g (variable selon les saisons)

Maturité sexuelle : environ 12 mois

Espérance de vie : 9 ans en moyenne. ●

Biologie

La Chevêche d'Athéna est sédentaire et passe donc l'hiver chez nous. Elle pond de 1 à 7 œufs en général entre mi-avril et mi-mai. Si la première ponte a échoué, les pontes de remplacement sont rares. Le nombre de jeunes qui sortiront effectivement du nid est souvent bien inférieur (de 3 à 4 en moyenne) et la prédation entraîne parfois un échec total de la nichée. Les jeunes restent au nid entre 30 et 35 jours puis se dispersent ensuite dans un rayon de 20 km autour de leur site de naissance.

Chassant essentiellement la nuit, la Chevêche a un régime alimentaire diversifié. Les saisons vont largement déterminer le choix de ses proies : petits mammifères (campagnols), petits oiseaux, lézards, insectes, escargots, vers de terre, etc... L'été, sauterelles et criquets sont largement consommés alors que l'hiver, les Campagnols des champs sont sa principale proie sur les causses. ●

Evolution des populations

Espèce protégée, la chouette chevêche voit pourtant ses populations régresser dans la plupart des régions de France. L'espèce

